


附件（資料來源：臺灣維管束植物簡誌、臺灣稀有及瀕危植物之分級彩色圖鑑）

**臺灣油杉** *Keteleeria davidiana* var. *formosana*

臺灣油杉為臺灣特有的松科常綠大喬木，高三十五公尺，直徑可達一·五公尺，幹皮灰褐色，有不規則縱溝，呈鱗片狀剝落；枝條輪生，開展。葉扁平，兩列互生，線形，先端鈍形至圓形或微凹頭，基部漸狹，中肋兩面隆起，葉緣略反捲。雄毬花圓柱狀，簇生於枝端；毬果單生，圓柱狀長橢形，直立，果鱗卵圓形，邊緣略外捲且開裂；苞鱗卵狀披針形，長約果鱗之半。種子有翅、卵形，長約一公分。

臺灣油杉雌花



臺灣油杉



臺灣油杉毬果



臺灣油杉雄花



臺灣油杉植株



## 自然紀念物－珍貴稀有植物

### (一) 臺灣穗花杉 *Amentotaxus formosana*

臺灣穗花杉為紅豆杉科常綠小喬木，高可達十公尺，胸徑三十公分，葉呈鎌刀狀，長五至八·五公分，表面深綠色且具光澤，裡面具二道白色氣孔帶，葉緣反捲雌雄異株，雄花序穗狀，三至五穗生長於小枝頂端，雌花單生於葉腋，一芽四至六朵。種實核果狀，腋生，長柄，橢圓形，暗紫色。

臺灣穗花杉葉及雌花



臺灣穗花杉葉及雄花

臺灣穗花杉



臺灣穗花杉葉及果實




臺灣穗花杉植株



(二) 南湖柳葉菜 *Epilobium nankotaizanense*

南湖柳葉菜為臺灣特有柳葉菜科多年生草本植物。葉對生或互生，密集生長，橢圓形或圓形，葉柄明顯。花頂生，紫紅色，花萼深四裂，花深四裂，花瓣四枚，花筒細長，子房下位，種子頂端具一叢柔毛。



南湖柳葉菜



南湖柳葉菜植株



南湖柳葉菜植株

### (三) 臺灣水青岡 *Fagus hayatae*

臺灣水青岡又名山毛櫸，為殼斗科落葉喬木，幹皮光滑，灰白色。幼葉背脈散生金黃色毛茸，葉橢圓形至卵形，先端銳形，基部圓形或楔形，鋸齒緣，側脈七至十對，平行，表面凹陷，裡面隆起。花單性同株，雄花四至六朵，成繖形頭狀花序簇生於葉腋，下垂，苞片線形，被毛，脫落性，花被筒狀，外被金黃色長柔毛，雄蕊五至十二枚。雌花一至二朵著生於一長總梗上，腋生，花被筒狀，被毛。殼斗卵球形，表面有軟棘，熟時四裂，堅果常為二枚，具三條翼狀稜脊。



臺灣水青岡



臺灣水青岡雄花




臺灣水青岡雄花



臺灣水青岡果實



臺灣水青岡果實



臺灣水青岡植株



臺灣水青岡小苗




臺灣水青岡植株




## 臺灣水青岡植株

### (四) 清水圓柏 *Juniperus chinensis* var. *taiwanensis*

清水圓柏為柏科常綠匍匐性或直立灌木或小喬木，葉兩形，幼葉線形，對生或三葉輪生，銳頭，表面凹，下面有稜；普通葉鱗狀，交叉對生。毬果球形，種子三枚，呈三角狀橢圓形。



清水圓柏植株



清水圓柏



清水圓柏

