

FORMOSAN BLACK BEAR



熊出沒注意

◆臺灣黑熊痕跡辨識◆

臺灣黑熊天性機警

要在野外看見牠們實在不容易

但凡走過必留下蛛絲馬跡

黑熊的痕跡有哪些種類？該如何辨識呢？

足跡

熊腳印類似人的光腳丫

臺灣黑熊體型粗壯，全身黝黑，

胸前的白色V字斑紋格外耀眼。

尾巴粗短，僅約10公分。

吻鼻部延長似狗，俗稱「狗熊」。

雌雄從外觀上不易分辨，

成體母熊50-101公斤，

公熊60-133公斤。



↑

20 cm

臺灣黑熊跟人一樣，整個腳掌裸露，前後腳都有五個趾頭，還有尖銳的爪子。熊擅長爬樹，也擅挖掘。前掌短且寬，掌全長13-23公分，後掌較狹長，掌全長15-26公分。在泥巴地或沙灘上比較容易留下完整的熊腳印，但不見得會有爪痕。

食痕

動植物不拘
有什麼吃什麼

野蜜蜂會在天然樹洞、石縫築巢，
蜂蜜和幼蟲都是黑熊最愛的食物，
跟小熊維尼一樣。

黑熊的嗅覺相當靈敏，
隱藏再好的蜂窩都逃不過熊的偵測。

當看到樹幹上有個大洞，
洞口周圍木材和樹皮被啃咬、撕裂，
像是由內而外炸開樹皮木屑散落一地，
有時甚至會看到洞口仍有幾隻蜜蜂徘徊，
就是被黑熊肆虐過的野蜂窩！

黑熊也會獵捕動物或吃死屍
例如圖中水鹿，或山羌。

被熊扒挖過的
野蜜蜂窩

中華蜜蜂

折枝

靈巧的覓食策略



被熊折咬，掉落地面的折枝

事實上，植物是黑熊的主食，
黑熊爬上樹吃果實，如殼斗科或樟科植物，
會用前掌抓住枝條往自身彎折，以利吃到末端的果實。
於是樹上就留下一叢叢枯萎的枝葉垂掛其間，有時也會掉落地面。

糞便

又稱排遺

黑熊是雜食性的，動植物不拘。
排遺裡經常有植物莖葉或種子等殘渣，
也常有動物毛髮或骨骸碎片，
如山羌、野山羊、蜜蜂、螞蟻、甲蟲等。
排遺的形狀、質地、顏色與吃進去的食物種類有關，
一般呈圓筒狀，直徑約2至5公分，整坨寬度大約8-13公分。



含水鹿毛髮及碎骨片



含青剛櫟果仁碎片



吃過呂宋莢蒾紅通通的



含雅楠種子

12 cm

爪痕


凡爬過必留下痕跡

黑熊擅長爬樹，
並會在樹上留下爪痕。
熊有五趾，一枚爪痕可能有五趾，
但也常只留下四趾、三趾爪痕。
爪痕前端尖後端鈍，與刀痕不同，
每趾間距約1.5-2.5公分。
爪痕隨著樹木長大，會越來越不明顯。
可辨識期約3至10年。

水鹿磨角痕凌亂無章
常被誤認為熊爪痕。



熊爪痕通常3-5線，彼此平行。



左前掌印

熊窩

樹上地上都能睡

臺灣黑熊會利用地面上的茂密芒草或灌叢做窩。

外觀上看起來就像一個大鳥巢，

中心會有深陷的黑熊身體壓痕，

周圍的草葉會有被交疊「編織」的痕跡。

熊窩裡面經常可以發現熊毛，

附近也可能會發現熊排遺。

黑熊居無定所，走到哪睡到哪，
熊窩只用來短暫休息而已。



樹窩俯視

80 cm

熊也會在樹上做窩，有時在樹上覓食，
牠們會將樹枝往自身方向彎折取食末梢的果實，
並將枝條壓在自己身體下，交疊變成一個平台窩，
黑熊在這平台上大塊朵頤，也利用此平台休息。



若您發現黑熊痕跡，可以這麼做：

- | 拍照務必擺比例尺（如量尺、原子筆、硬幣等）
- | 多拍幾張不同角度
- | 若發現新鮮痕跡，請需提高警覺

● 熊出沒通報系統



台灣黑熊保育協會
線上通報

● 林業保育署通報專線 0800-000-930

台灣黑熊保育協會 02-2381-8696

將協助鑑定黑熊痕跡，並提供應變建議。



林業及自然保育署
Forestry and Nature Conservation Agency



Taiwan Black Bear
台灣黑熊
保育協會
Conservation Association